7. R. gallica L., Sp. Pl. 1: 492 (1753) [gállica]

Ind. loc.: "Habitat in Gallia"
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 223 fig. 1798 (1933); C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 86: 36 lám. 4 (1964)

Arbusto de hasta 1 m. Tallos ± erectos, flexibles, ascendentes, verdes o rojizos; los jóvenes, con acúleos de sección circular o subcircular, heterogéneos –unos grandes de hasta 5 × 2,2 mm, ligeramente curvos, otros de 2-3 × 0,6-1,2 mm, rectos–, mezclados o no con acículas, setas y glándulas estipitadas, de tamaño desigual; los tallos viejos, solo con acúleos o inermes. Hojas, en general, sin acúleos subestipulares; folíolos 3-5(7), de (2)2,5-7 × 1,8-4 cm, de ovados a orbiculares, obtusos o agudos, subcordados en la base, coriáceos, de haz áspera y lustrosa, y envés pubérulo, simple o doblemente aserrados, con dientes frecuentemente glandulosos y ciliados; pecíolo y raquis pubérulos, con glándulas estipitadas y pequeños acúleos muy dispersos, que pueden alcanzar el nervio medio; estípulas 1,6-2,5 × 0,5-1,4 cm, que se ensanchan gradualmente, de haz glabra, envés pubérulo, y margen glanduloso, con aurículas poco divergentes. Inflorescencia de 1(2) flores; brácteas 0-2, de menos de 1,5 cm, caducas; pedicelos 2-6 cm, erectos, con glándulas estipitadas, muchas de ellas espinescentes, a veces con alguna acícula. Receptáculo con disco de 5,5-6,5(11) mm, ligeramente cónico; orificio 2,5-3,5(7) mm. Sépalos 1,6-3,5 × 0,5-1,1 cm, de ovados a ovado-lanceolados, pubérulos en el ápice, glabrescentes y con glándulas estipitadas en la parte media y basal, reflejos tras la antesis, caducos antes de la madurez de la úrnula; los externos, con 3-7 lóbulos laterales de 2-5 mm; apéndice terminal 0,5-1,5 mm, entero o algo pinnatífido, a veces foliáceo. Corola 5-6 cm de diámetro, simple o doble (10 o más pétalos); pétalos 2,5-4 cm de anchura, poco escotados, de un rosado purpúreo a rosa pálido. Anteras con frecuencia curvas. Estilos libres, pelosos, agrupados, que forman una piña estigmática muy convexa, con los estigmas a varias alturas, que se eleva sobre el disco 5-7 mm, y que no sobrepasa en altura a los estambres internos. Úrnulas 8-11 mm de diámetro, ovoide, coriácea, en general con glándulas estipitadas que se caen al madurar, rojiza. $2n = 28$* (4*x*; meyosis 14II).

Setos y bordes de camino; 30-1350 m. IV-VII. ¿Originaria del S y C de Europa? −desde Francia hasta el C de Rusia y Crimea−, ¿el Cáucaso?, ¿Anatolia?, ¿el Irán?; como naturalizada, en la Península Ibérica, Córcega, cerdeña, Sicilia, Norteamérica, etc. En la Península Ibérica fue cultivada hasta comienzos del siglo XX, persistiendo durante años en antiguos jardines abandonados; posiblemente subespontánea en Cs, Hu y AAl. **Esp.:** [B] [Ba] [Ca] [Co] [Cs] [Hu] [J] [Lo] [Lu] [PM] [Mll] [(Na)] [O] [Te] [To] [Z]. **Port.:** [AAl] [(BAl)] [(BL)] [(BB)] [(E)]. **N.v.:** rosal de Alejandría, rosal de Jericó, rosal de Provenza; *port.:* roseira-de-alejandría, roseira-de-provença; *cat.:* roser gàl·lic.

Observaciones.−Todo el material que hemos visto corresponde a la var. *eriostyla* R. Keller, la que según parece debería considerarse var. *gallica*.

Sus poblaciones van desapareciendo; de un total de 20 pliegos estudiados solo 6 han sido recolectados después de 1920.