Parietaria mauritanica Durieu in Duch., *Rev. Bot.* 2: 427 (1847).

Endemismo Iberico-Magrebí. Andévalo, Aracena, Sierra Norte. Muros, acantilados y roquedos nitrificados. Relativamente común.

Citas previas. Rivera & Cabezudo (1985: 64), Valdés & al. (1987, 1: 157).

Fagaceae

Quercus coccifera L., *Sp. Pl.* 995 (1753).

Mediterráneo. Andévalo, Aracena, Sierra Norte. Matorrales y formaciones vegetales de degradación de encinares. Indiferente edáfica. Común.

Citas previas. Rivas Goday (1964: 437), Rivera & Cabezudo (1985: 63), Valdés & al. (1987, 1: 160), Pérez Latorre & al. (1993: 237).

Quercus ilex L., *Sp. Pl.* 995 (1753).
subsp. **ballota** (Desf.) Samp. in *Bol. Soc. Brot.* 24: 102 (1808-1809).

Q. rotundifolia Lam., *Encycl.* 1: 723 (1785).

Oeste de la Región Mediterránea. Andévalo, Aracena, Sierra Norte. Bosques y dehesas; indiferente edáfico. Muy común.

Citas previas. Rivas Goday (1964: 437, 447, 502, 558 sub *Q. ilex* L.), Rivas Martínez (1979: 47, 93), Rivera & Cabezudo (1985: 64), Valdés & al. (1987, 1: 161), Pérez Latorre & al. (1993: 237, 248), Pérez Latorre & Cabezudo (2002: 284).

Quercus suber L., *Sp. Pl.* 995 (1753).

Oeste de la Región Mediterránea. Andévalo, Aracena, Sierra Norte. Bosques y dehesas sobre suelos ácidos. Común.

Citas previas. Rivas Goday (1964: 447, 501), Rivera & Cabezudo (1985: 64), Valdés & al. (1987, 1: 161), Pérez Latorre & al. (1993: 237, 248, 249), Pérez Latorre & Cabezudo (2002: 284).

Quercus pyrenaica Willd., *Sp. Pl.* 4 (1): 451 (1805).

Oeste de la Región Mediterránea. Aracena. Bosques, setos, sobre suelos ácidos, por encima de los 700 m. Relativamente común.

Citas previas. Rivera & Cabezudo (1985: 64), Valdés & al. (1987, 1: 162).